

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

P 0 3 - 6 - 9 2 0 1 4 6 5 4



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 8
du 25 mai 1992

VIGNE

Mildiou

La première tache d'huile "Contamination primaire" sur feuille de Carignan a été découverte le 19 mai dans la région de Linguizzetta, ce qui laisse supposer que la contamination remonte au 12 mai.

Les autres foyers primaires observés dans la semaine suivante vont favoriser le repiquage des foyers secondaires à la faveur d'une succession de périodes pluvio-orageuses.

Si les organes verts de la vigne ont déjà été couverts par un produit de contact avant la pluie contaminatrice, il conviendra d'assurer la protection en fonction des pluies et de la croissance de la vigne. La durée d'action est de 7 jours.

Si des pénétrants ont été utilisés à bon escient (souvent associés à des produits de contact) la protection est similaire, avec un avantage supplémentaire, qu'ils peuvent "stopper" en début d'attaque après la pluie contaminatrice. Ils seront préférés en ce moment.

Il était donc inutile jusqu'à présent d'utiliser au départ "la grosse artillerie" des systémiques pensant se sécuriser d'autant que les risques d'apparition de souches de mildiou résistantes sont à craindre.

La floraison est amorcée pour les cépages précoces, en début pour les autres. C'est une période très sensible pendant laquelle la vigne doit être absolument protégée... Effectuer votre traitement au fur et à mesure que les cépages atteignent ce stade.

<< Consulter le tableau des spécialités anti-mildiou ci joint et conservez le soigneusement >>.

Oidium

A Prévoir un soufrage en pleine floraison.

Les conditions actuelles sont favorables à cette maladie.

(Consulter le tableau des anti-oïdium ci-joint).

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
Directeur-Gérant : G. FELICI

Abonnement Annuel : à
Régisseur de Recettes

Publication Périodique
CPPAP N° 1769 - AD

I S S N
0739 - 9633

S. R. P. V.

Cicadelles de la Flavescence Dorée

Les premières éclosions ont été observées le 13 mai .Ne pas intervenir pour l'instant.

Vers de la grappe = Eudemis et Cochylis

Les premières glomérules (amas cotoneux, soyeux tissés par la jeune chenille autour des boutons floraux) sont observés .Cependant le seuil de nuisibilité de 200 glomérules sur 100 grappes n'est pas encore atteint pour intervenir.

Poursuivez vos observations ou faites appel à un technicien.

ARBRES FRUITIERS A NOYAUX

Oïdium

Poursuivre la protection

Cerise

La maturité des cerises et la récolte de certaines variétés se poursuivent. Plus de traitement pour ces dernières. Pour les autres variétés où les risques de monilia sont à craindre en cas de risque de pluie, intervenir avec des fongicides présentant un délai d'emploi avant récolte suffisant.

Olivier

Intervenir contre la teigne qui risque de dévorer les boutons floraux :

Préférer les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis au Carbaryl ou au Diméthoate qui détruisent de nombreux auxiliaires.

Agrumes

Aleurodes, Dialeurodes citri

Les vols sont abondants dans certaines parcelles ; les pontes sont déposées.

Surveiller ou faites les surveiller avant d'intervenir au bon moment.

(C) S.R.P.V. 1992 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation